

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES

FICHA ICTIOLÓGICA 004

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR

Aguarunichthys torosus (Stewart, 1986)



Nombres comunes: Bagre manchado.

Nombre en kichwa:

Taxonomía: Orden Siluriformes; Familia Pimelodidae.

Características: Cabeza en punta, cuerpo robusto; boca subterminal; las barbillas maxilares se extiende posteriormente hasta el origen de la aleta anal, los barbos del mentón se extienden hasta casi el extremo posterior de la aleta pectoral; aleta dorsal moderadamente larga, en punta y con su margen posterior cóncavo, segundo radio de la aleta dorsal fino y flexible segmentado distalmente, sin serraciones en el margen posterior, ligeramente más largo que el primer radio ramificado; aleta adiposa presente, aleta caudal bien bifurcada, el lóbulo superior termina en punta; tiene una excepcional vejiga natatoria, la cual tiene proyecciones como dedos a lo largo del margen posterolateral (Stewart, 1986).

Talla máxima registrada: 34,6 cm (Lundberg y Littmann, 2003).

Color: Superficies lateral y dorsal de cuerpo café oscuro u oliva, cabeza y cuerpo con pequeñas manchas redondeadas color café oscuro; región ventral de cabeza y cuerpo sin manchas; aletas dorsal, adiposa y caudal con manchas similares al del cuerpo (Stewart, 1986).

Alimentación: Carnívoros se alimentan de peces pequeños.

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales, se conoce muy poco de su biología; se la encuentra distribuida en la cuenca del río Amazonas en los países de Bolivia, Ecuador y Perú (Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2022).

Hábitos reproductivos: No se encontró información al respecto.

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborígen.

Lista roja: Esta especie no ha sido evaluada por la UICN.

Elaborado por: M.Sc. Enrique Laaz M.
elaaz@institutopesca.gob.ec