

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES

FICHA ICTIOLÓGICA 009

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR

Brachyplatystoma platynema (Boulenger, 1898)



Nombres comunes: Bagre lechero.

Nombre en kichwa:

Taxonomía: Orden Siluriformes; Familia Pimelodidae.

Características: Cuerpo alargado, algo robusto, cabeza aplanada, deprimida; aleta adiposa presente; hocico espatulado, de borde redondeado; dientes vomerianos presentes, formando una banda muy amplia, en la maxila superior es mucho más grande que en la inferior; ojo pequeño; proceso occipital corto, muy separado de la aleta dorsal; barbos maxilares y del mentón muy aplanados, los barbos superiores son largos, llegan hasta las aletas ventrales, los barbos del mentón llegan hasta las aletas pectorales; aleta caudal bifurcada, el lóbulo superior termina en un filamento (Boulenger, 1898).

Talla máxima registrada: 100 cm (Lundberg, J.G. and M.W. Littmann, 2003).

Color: Cabeza, dorso y lados superiores del cuerpo color gris oscuro, región abdominal más clara, aleta caudal, adiposa y dorsal gris claro.

Alimentación: Carnívora, se alimenta de peces pequeños.

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales; prefiere habitar el fondo de los ríos, se distribuye en la cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco, en los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2022).

Hábitos reproductivos: Se reproduce al inicio de las lluvias y en el periodo de aguas altas, son desovadores totales y suelen realizar migraciones reproductivas cortas.

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborigen y pesca deportiva.

Lista roja: Esta especie no se encuentra registrada en la lista roja de la UICN.

Elaborado por: Mgs. Enrique Laaz M.
elaaz@institutopesca.gob.ec