

SEGUIMIENTO A LA PESQUERÍA DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS Reporte Biológico Pesquero, mayo 2019

La información procede del seguimiento de la pesquería de PPP en los diferentes puertos de desembarque (Salango, Machalilla, Crucita, Anconcito, La Libertad, Chanduy), entre el 26 y 31 de mayo. La captura estuvo constituida principalmente por Macarela, Botella y Pinchagua (85%), además de picudillo y “otras” especies (15%).

Zonas de pesca

La flota efectuó sus faenas de pesca a lo largo de la costa ecuatoriana, registrándose, mayores concentraciones al sur de la provincia de Manabí y alrededor de la Puntilla de Santa Elena, registrando capturas principalmente de botella, macarela, sardina redonda y en menor concentración pinchagua y picudillo.

En el estuario externo del Golfo de Guayaquil se registraron las mayores concentraciones de morenillo (macarela) y capturas dispersas de botella y sardina redonda (Fig. 1).





Figura 1. Zonas de pesca reportadas en mayo 2019.


Pinchagua (*Opisthonema* spp.)



(*) TMMS: Talla Media de Madurez Sexual (21.6 cm LT)

PARAMETROS	RESULTADOS
Rango de tallas:	12 - 26 cm LT
Mayor Frecuencia talla:	14 cm LT
Talla Promedio Captura:	18,3 cm LT
% Hembras	53 %
% Machos	47 %
< TMMS (LT _{50%})*:	80 %
> TMMS (LT _{50%})*:	20 %
Estadios de Madurez	Sexualmente inmaduros (85%)
Puertos desembarque:	Arenales, Machalilla
Destino de la pesca:	Conserva


Macarela (*Scomber japonicus*)



(*) TMMS: Talla Media de Madurez Sexual (25,3 cm LF)

PARAMETROS	RESULTADOS
Rango de tallas:	19 - 34 cm LF
Mayor Frecuencia talla:	21 y 22 cm LF
Talla Promedio Captura:	24.3 cm LF
% Hembras	53 %
% Machos	47 %
< TMMS (LT _{50%})*:	100 %
> TMMS (LT _{50%})*:	0 %
Estadios de Madurez	Sexualmente inmaduros (49%), Sexualmente maduros (35%)
Puertos desembarque:	Salango
Destino de la pesca:	Harina pescado, fresco congelado


Botella (*Auxis* spp.)



(*) TMMS: Talla Media de Madurez Sexual (26,2 cm LF)

PARAMETROS	RESULTADOS
Rango de tallas:	22 - 32 cm LF
Mayor Frecuencia de talla:	29 cm LF
Talla Promedio Captura:	28.2 cm LF
% Hembras	52 %
% Machos	48 %
< TMMS (LT _{50%})*:	30 %
> TMMS (LT _{50%})*:	70 %
Estadios de Madurez	Sexualmente inmaduros (97%)
Puertos de desembarque:	Salango, Chanduy, Anconcito
Destino de la pesca	Harina de pescado, Carnada


Picudillo (*Decapterus macrosoma*)



(*) TMMS: Talla Media de Madurez Sexual (16,3 cm LT)

PARAMETROS	RESULTADOS
Rango de tallas:	17 - 22 cm LF
Mayor Frecuencia talla:	19 cm LF
Talla Promedio Captura:	19.3 cm LF
% Hembras	30 %
% Machos	70 %
< TMMS (LT _{50%})*:	45 %
> TMMS (LT _{50%})*:	55 %
Estadios de Madurez	Sexualmente inmaduros (97%)
Puertos de desembarque:	Chanduy
Destino de la pesca	Consumo directo, Harina de pescado

Hojita (*Chloroscombrus orqueta*)



PARAMETROS	RESULTADOS
Rango de tallas:	17 - 23 cm LT
Mayor Frecuencia talla:	19 cm LT
Talla Promedio Captura:	19,6 cm LT
% Hembras	34 %
% Machos	66 %
Estadios de Madurez	Sexualmente inmaduros (100%),
Puertos desembarque:	Machalilla
Destino de la pesca	Consumo