

**INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA  
UNIDAD DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS DEMERSALES Y AGUA  
DULCE/EMBALSES  
PROGRAMA PESCA ARTESANAL  
REPORTE PESQUERO, PROVINCIA DE SANTA ELENA - OCTUBRE 2023**

La información que se presenta en este reporte, procede del seguimiento de la pesca artesanal de peces demersales en los puertos pesqueros de Santa Rosa y Anconcito, se estimó el desembarque total en 761,42 t, las especies con más representatividad fueron: *Hemanthias signifer* (rabijunco) 45,82%, y *Merluccius gayi* (merluza) 29,09 %, siendo el puerto de Santa Rosa donde se registró mayor desembarque con 674,5 t. (Tabla 1)

**Tabla 1.** Desembarque total (t) estimado de peces demersales por puerto.

Especies		Puertos		Total (t)	Porcentaje %
Nombre Común	Nombre científico	Anconcito	Santa Rosa		
Roncador Trompudo	<i>Anisotremus interruptus</i>	0,62		0,62	<b>0,08%</b>
Bagre colorado	<i>Bagre panamensis</i>	0,91		0,91	<b>0,12%</b>
Rojito	<i>Baldwinella eos</i>		0,72	0,72	<b>0,09%</b>
Corvina de roca	<i>Brotula clarkae</i>	17,33	1,06	18,39	<b>2,42%</b>
Chilindrina	<i>Brotula ordwayi</i>	0,33	1,36	1,70	<b>0,22%</b>
Palma	<i>Calamus brachysomus</i>		1,46	1,46	<b>0,19%</b>
Cabezudo	<i>Caulolatilus affinis</i>	2,77	0,45	3,22	<b>0,42%</b>
Robalo armado	<i>Centropomus armatus</i>		0,30	0,30	<b>0,04%</b>
Robalito	<i>Centropomus robalito</i>	2,44	3,28	5,72	<b>0,75%</b>
Castaña	<i>Chromis intercrusma</i>	0,10		0,10	<b>0,01%</b>
Corvina	<i>Cynoscion albus</i>	1,02		1,02	<b>0,13%</b>
Mojarra	<i>Diapterus peruvianus</i>	0,40		0,40	<b>0,05%</b>
Camotillo	<i>Diplectrum maximum</i>		0,45	0,45	<b>0,06%</b>
Morena pecosa	<i>Echidna nocturna</i>	0,66		0,66	<b>0,09%</b>
Corvina	<i>Elattarchus archidium</i>	0,24	0,16	0,40	<b>0,05%</b>
Cojinoba	<i>Euprepocaranx dorsalis</i>	0,05		0,05	<b>0,01%</b>
Roncador rayado	<i>Genyatremus dovii</i>	0,11		0,11	<b>0,01%</b>
Mojarra	<i>Gerres simillimus</i>	0,15		0,15	<b>0,02%</b>
Roncador	<i>Haemulon steindachneri</i>		0,13	0,13	<b>0,02%</b>
Rabijunco	<i>Hemanthias peruanus</i>		1,64	1,64	<b>0,21%</b>
Rabijunco	<i>Hemanthias signifer</i>		348,89	348,89	<b>45,82%</b>
Culona	<i>Lepophidium negropinna</i>	0,49		0,49	<b>0,06%</b>
Berrugate	<i>Lobotes pacificus</i>	0,33		0,33	<b>0,04%</b>
Pargo	<i>Lutjanus argentiventris</i>	0,33		0,33	<b>0,04%</b>
Pargo lunarejo	<i>Lutjanus guttatus</i>	0,58	0,44	1,02	<b>0,13%</b>
Merluza	<i>Merluccius gayi</i>	5,98	215,53	221,51	<b>29,09%</b>
Corvinon/torno	<i>Micropogonias altipinnis</i>	2,10		2,10	<b>0,28%</b>
Lisa	<i>Mugil cephalus</i>	3,88	3,08	6,96	<b>0,91%</b>
Anguila moteada	<i>Myrichthys tigrinus</i>	0,11		0,11	<b>0,01%</b>
Anguila	<i>Ophichthus remiger</i>	5,80		5,80	<b>0,76%</b>

Teniente	<i>Orthopristis chalcea</i>	0,79	1,76	2,55	<b>0,33%</b>
Perela	<i>Paralabrax callaensis</i>	17,84	9,06	26,90	<b>3,53%</b>
Perela	<i>Paralabrax humeralis</i>	11,43	59,16	70,58	<b>9,27%</b>
Selemba	<i>Paranthias colonus</i>	0,17	0,07	0,25	<b>0,03%</b>
Leonora	<i>Parapsettus panamensis</i>		1,46	1,46	<b>0,19%</b>
Camiseta rayada	<i>Pareques lanfeari</i>	0,24	0,15	0,39	<b>0,05%</b>
Pámpano	<i>Peprilus medius</i>	1,21	0,45	1,66	<b>0,22%</b>
Lechuza	<i>Pontinus sierra</i>	0,49	3,39	3,87	<b>0,51%</b>
Gallineta	<i>Prionotus stephanophrys</i>	0,49	0,09	0,58	<b>0,08%</b>
Pez sol	<i>Pristigenys serrula</i>		0,28	0,28	<b>0,04%</b>
Rojito	<i>Pronotogrammus multifasciatus</i>		2,40	2,40	<b>0,31%</b>
Pargo blanco	<i>Rhencus panamensis</i>	0,56	0,40	0,96	<b>0,13%</b>
pez loro	<i>Scarus perrico</i>	0,69		0,69	<b>0,09%</b>
Brujo	<i>Scorpaena afuerae</i>	0,10	0,21	0,31	<b>0,04%</b>
Brujo	<i>Scorpaena mystes</i>	0,22	0,81	1,03	<b>0,14%</b>
Cara de caballo	<i>Selene brevoortii</i>		0,60	0,60	<b>0,08%</b>
Carita	<i>Selene orstedii</i>		0,21	0,21	<b>0,03%</b>
Carita	<i>Selene peruviana</i>	3,24	2,29	5,53	<b>0,73%</b>
camotillo negro	<i>Serranus huascarii</i>		1,70	1,70	<b>0,22%</b>
Picuda	<i>Sphyraena ensis</i>		9,24	9,24	<b>1,21%</b>
corvina rabo amarillo	<i>Umbrina xanti</i>	2,32	1,63	3,95	<b>0,52%</b>
Ojon/olloco	<i>Xenichthys xanti</i>	0,39	0,20	0,59	<b>0,08%</b>
<b>Total general</b>		<b>86,92</b>	<b>674,50</b>	<b>761,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Porcentaje por puertos (%)</b>		<b>11,42%</b>	<b>88,58%</b>		

Se estimó la flota activa en los puertos pesqueros de la provincia de Santa Elena, Santa Rosa fue el puerto con más embarcaciones activas (70), las cuales dirigen su esfuerzo de pesca a especies demersales (Tabla 2).

**Tabla 2.** Estimación de la flota activa por puerto, arte de pesca y recurso

Puertos	Tipo Embarcación	Arte de pesca	Recurso	Nro. Embarcaciones activas
Anconcito	Fibra de vidrio	Espinel de Fondo	Rabijunco, Perela, Camotillo, Rojito, Cabezudo, Brujo, Merluza, Mero, Lisa, Carita, Morena, Ojo de uva	25
		Enmalle de Fondo		30
Santa Rosa		Línea de mano		40
		Enmalle de Fondo		15
		Espinel de Fondo		10

Elaborado por: MSc. Enrique Laaz; [elaaz@institutopesca.gob.ec](mailto:elaaz@institutopesca.gob.ec)