

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO
PUERTO JELI Y HUALTACO - PROVINCIA DE EL ORO

Se presenta la información pesquera correspondiente al mes de abril de 2025 sobre el cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*) en la provincia de El Oro. Los puertos visitados fueron Hualtaco y Puerto Jeli. La extracción de los cangrejos se llevó a cabo en los siguientes esteros: En Hualtaco: Los Cabos, Piedras, Zapote Grande, El Cementerio, Chupadores y Las Huacas. En Puerto Jeli: Jumóm, Lagarto, Dos Hermanos, Saca Mano, Los Patos, Guarumal y Cargadero. La información que se detalla a continuación corresponde al muestreo realizado en estos puertos, e incluye los indicadores de esfuerzo de pesca (número de recolectores) y la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE).

>>> INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO ANALISIS	DE	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
Abril 2025		5225 unidades de cangrejo	4 horas efectivas	 103

Cangrejo rojo (*Ucides occidentalis*)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO




>>> INDICADORES

La CPUE presento en abril un valor de 35 cangrejos /hombre /día


>>> TENDENCIAS



DESEMBARQUES (Número de individuos)



CPUE (Captura /hombre/día)



»» PRINCIPALES HALLAZGOS

En abril, Puerto Hualtaco presentó un esfuerzo de 42 recolectores, quienes lograron un desembarque total de 3.588 cangrejos. Esto se tradujo en una CPUE promedio de 43 cangrejos por hombre por día, lo cual indica una mayor eficiencia en la captura individual. Las zonas de captura utilizadas en este puerto incluyeron Los Cabos, Piedras, Zapote Grande, El Cementerio, Chupadores y Las Huacas, las cuales parecen mantener una buena disponibilidad del recurso.

Por otro lado, en Puerto Jelí, con un esfuerzo mayor de 61 recolectores, se obtuvo un desembarque total de 1.637 cangrejos, lo que representó una CPUE de apenas 27 cangrejos por hombre por día. A pesar del mayor número de recolectores, el rendimiento individual fue significativamente menor que en Hualtaco. Las zonas de captura en este puerto incluyeron Jumóm, Lagarto, Dos Hermanos, Saca Mano, Los Patos, Guarumal y Cargadero, lo cual sugiere una posible disminución en la abundancia del recurso o una mayor presión extractiva.

Durante esta salida de campo no fue posible obtener información sobre desembarques en Puerto Bolívar, ni registrar datos biológicos de talla en Bolívar, Jelí y Hualtaco, debido a limitaciones de tiempo. La jornada se destinó prioritariamente al desarrollo de un taller de capacitación realizado en el Laboratorio de Tumbes, Perú, enfocado en la lectura y reconocimiento de las fases de madurez gonadal en hembras de cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), utilizando la escala de madurez validada histológicamente. Adicionalmente, se socializaron los avances en la estandarización de metodologías para las evaluaciones biológicas y poblacionales del recurso, en el marco del compromiso binacional entre Ecuador y Perú.