




## SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO EN PLAYAS Y PUERTO ENGABAO – PROVINCIA DEL GUAYAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco capturado por la flota artesanal, obtenida mediante muestreos en la provincia del Guayas, llevado a cabo en los puertos de Playas y Engabao los cuales fueron establecidos a través del seguimiento realizado por el IPIAP.

### »»» INFORMACIÓN GENERAL


PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Mayo 2025	Playas 125.3 t Pto. Engabao 79.8 t	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 lances de pesca</li> <li>0.20 horas efectivas de pesca</li> </ul>	 Playas 200 Pto. Engabao 150

### *Penaeus occidentalis*




### ARTE DE PESCA

Trasmallo de fondo



### ZONA DE MUESTREO




### »»» INDICADORES

<b>71%</b>	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	<b>78.7%</b>	En relación al mes anterior existió un incremento en los desembarques
<b>29%</b>	Ejemplares adultos dentro de las capturas	<b>88%</b>	Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas




## »»» TENDENCIAS


### EXTRUCTURA DE TALLAS




### VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES TOTALES (t)



### VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



### COMPOSICION DE LAS CAPTURAS PESCA OBJETIVO



### VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 21 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.5 cm Lt

## »»» PERSPECTIVAS

Según los pescadores el recurso se está recuperando, esperarían que en los próximos meses mejore la producción a pesar que a partir de junio las aguas empiezan a enfriar y el camarón tiende a esconderse, lo que provocaría una disminución en los desembarques.

Elaborado por:  
Walter A. Mendívez Cucalón  
[wmendivez@institutopesca.gob.ec](mailto:wmendivez@institutopesca.gob.ec)