




ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD ICTIOPLANCTONICA DURANTE ABRIL 2025

PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA





La mayor abundancia de huevos y larvas en arrastre superficial se registró en Salinas.

En Puerto López predominó la presencia de larvas en la columna de agua.

Se observan diferencias en la distribución vertical y superficial de huevos y larvas entre ambas localidades.

Abundancia de huevos y larvas de peces abril 2025

Composición de especies según hábitat, Puerto López





Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bentp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Mp: Mesopelágico
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

Se evidenció una elevada abundancia de huevos de platija (*Pleuronichthys* spp.), propia de zonas demersal, seguida por sardina redonda (*Etrumeus acuminatus*), vinculada al ambiente costero. En el caso de las larvas, la mayor representación fue de plumón (*Bregmaceros bathymaster*), especie pelágica de hábitat costero.



Composición de especies según hábitat, Salinas



Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bentp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Mp: Mesopelágico
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

En Salinas predominó la abundancia de huevos de peces planos (*Citharichthys spp.*), especie demersal. En cuanto a larvas, destacaron plumón y chuhueco (*Bregmaceros bathymaster* y *Cetengraulis mysticetus*), ambas propias de hábitat costeros pelágicos. Esto sugiere un ambiente con influencia tanto bentónica como pelágica.