




ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD ICTIOPLANCTONICA DURANTE MARZO 2025

PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA



Abundancia de huevos y larvas de peces marzo 2025



En Puerto López, se registró desove en arrastre superficial.

Salinas presentó valores más representativos de huevos y larvas de peces a nivel superficial.

Se evidencia diferencia significativa entre zonas y tipos de arrastres.



Composición de especies según hábitat, Puerto López





Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bentp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Mp: Mesopelágico
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

Se registró desove de chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*), especie típica de aguas pelágicas costeras. A nivel larval estuvo representado por plumón (*Bregmaceros bathymaster*), y por mojarra (*Eucinostomus gracilis*) especie pelágica y demersal, respectivamente.



Composición de especies según hábitat, Salinas



Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bentp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Mp: Mesopelágico
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

En Salinas, los huevos más abundantes correspondieron a botella (*Auxis spp.*) especie pelágica, seguida de demersales como gallineta y platija (*Prionotus spp.* y *Pleuronichthys spp.*). A nivel larval, destaca la presencia significativa de plumón (*Bregmaceros bathymaster*) y mojarra (*Eucinostomus gracilis*); Esta combinación sugiere una influencia de hábitats compleja en la zona, con aportes tanto costeros como estuarinos.