

## REPORTE WEB AGOSTO 2025


### SEGUIMIENTO A LOS DESEMBARQUES DE MERLUZA EN SANTA ROSA Y ANCONCITO PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Se presenta la información biológica-pesquera de la merluza capturada por la flota artesanal, obtenida a través del monitoreo biológico y pesquero en los puertos de Santa Rosa y Anconcito.

#### ➡ INFORMACIÓN GENERAL

| PERIODO DE ANÁLISIS | DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO                | ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO                                   | FLOTA ACTIVA PROMEDIO                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agosto 2025         | Santa Rosa 229.27 t<br>Anconcito 218.29 t | 1 lance de pesca/2500 anzuelos<br>4 horas efectivas de pesca |  Santa Rosa 12<br>Anconcito 12 |


#### Zonas de captura



#### *Merluccius gayi*-Merluza



#### Arte de pesca: Espinel de fondo




#### ➡ INDICADORES

- 1 % de individuos juveniles
- 42.33 % ejemplares en estadio (II)
- disminución del 6.54 % en los desembarques en relación al mes anterior
- 2.46 % IGS bajo indica reposo sexual


## TENDENCIAS




### Desembarque Total



### Variación de talla media de captura



### Índice Gonadosomático (IGS)



Talla media de madurez sexual (TMMS): 31.4 LT (cm)

Valores críticos: Valor crítico IGS (3%) (----)

## PERSPECTIVAS

En agosto las capturas mostraron una reducción del 6,54 %, tras la leve caída del 2 % en junio, tendencia vinculada a factores ambientales desfavorables y al desvío del esfuerzo pesquero en Anconcito hacia la perela. Aun así. Según proyecciones del CIIFEN<sup>1</sup>, se espera una transición a condiciones frías, esto favorecería al aumento de las capturas en los próximos meses. En cuanto a las tallas, existe un predominio de ejemplares adultos con medianas cercanas a 40–50 cm de longitud, Por otra parte, el incremento del IGS de 1,85 % a 2,46 % evidencian una recuperación gonadal progresiva tras la fase post-reproductiva.

<sup>1</sup> CIIFEN, agosto del 2025. El Niño/La Niña en América Latina.