



SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO BALAO, NARANJAL Y CHURUTE - PROVINCIA DEL GUAYAS

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente al mes de abril de 2025, en la provincia del Guayas. Los puertos visitados fueron Balao, Naranjal y Churute. La extracción de los cangrejos se realizó en los esteros Palisudo, Marranche, Colombiana, Río Naranjal, Cruce Grande, Jaguas, Bocana y Miramar. La información que se detalla a continuación corresponde al muestreo efectuado en estos puertos de la provincia del Guayas.

»» INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
Abril 2025	3012 unidades de cangrejo	4 horas efectivas	 98

Cangrejo rojo (Ucides occidentalis)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO




»» INDICADORES


99% De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura

»»» TENDENCIAS

ESTRUCTURA DE TALLAS




DESEMBARQUES (Número de individuos)



Valores críticos:

- Talla legal: 75mm AC
- Talla máxima: 90,4 mm AC

CPUE (Captura hombre/día)



»»» PERSPECTIVAS

En abril, el 99 % de los individuos registrados cumplió con la talla mínima de captura permitida, establecida en 75 mm de amplitud del cefalotórax. Naranjal reportó el mayor número de desembarques y la mayor CPUE promedio en comparación con Churute y Balao, debido al aumento del caudal de los ríos, lo que redujo las horas de trabajo en los demás puertos.

Cabe mencionar que, según los diálogos sostenidos con los cangrejeros, los puertos mencionados se encuentran afectados por la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Para mayo, se espera un incremento en los desembarques una vez concluida la estación invernal, así como la permanencia del alto porcentaje de individuos que cumplen con la talla legal de captura.