




ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD ICTIOPLANCTONICA DURANTE SEPTIEMBRE 2025

PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA





Se reporta una mayor abundancia de huevos en la zona de Salinas, con máximos valores entre zonas y tipos de arrastre; La abundancia de larvas fue relativamente baja.

En Puerto López, resalta una baja abundancia de huevos. Sin embargo, el registró de larvas fue abundante.





Composición de especies según hábitat, Puerto López



Se registró una alta abundancia de huevos de peces planos (*Paralichthys spp.*), asociados a hábitats demersales y de importancia comercial. En cuanto a las larvas, destacaron el pez linterna (*Benthoosema panamense*), de hábitats batipelágico, y la mojarra (*Eucinostomus gracilis*), una especie de hábitat demersal. Ambas son clave para la dinámica trófica local, ya que estos estadios tempranos funcionan como recurso alimenticio para otros peces de mayor talla y nivel trófico, sosteniendo así la productividad ecológica del área.



Composición de especies según hábitat, Salinas



En Salinas los huevos fueron mas abundantes, predominando los de botella (*Auxis spp*), típico de hábitat oceánico, contrastando con el número de larvas de peces que fue bajo representado por chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*) de hábitats costeros. Ambos de importancia comercial.