

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO
 BALAO, NARANJAL Y CHURUTE - PROVINCIA DEL GUAYAS

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente a septiembre del 2025, en la provincia del Guayas. Los puertos visitados fueron Balao, Pto. Baquerizo y Pto. Envidia. La extracción de los cangrejos se realizó en los esteros: Río Balao, Bocana, San Pablo, Camarona, Camaronera López, Culebra, Gabarra, Lince, la Manga, Marranche, Río Naranjal, Vaca y Tigre. La información que se detalla a continuación corresponde al muestreo efectuado en estos puertos de la provincia del Guayas.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
Septiembre 2025	6228 unidades de cangrejo	4 horas efectivas	 146

Cangrejo rojo (*Ucides occidentalis*)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO



INDICADORES


97% De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura

172.3% Incremento de las capturas comerciales con respecto al mes de agosto.

TENDENCIAS




ESTRUCTURA DE TALLAS




Valores críticos:

- Talla legal: 75.5 mm AC
- Talla máxima: 92 mm AC
- Talla Mínima: 70 mm AC

DESEMBARQUES (Número de individuos)



CPUE (Captura hombre/día)



PRINCIPALES HALLAZGOS Y PERSPECTIVAS

En septiembre se observó un incremento en el número de cangrejos capturados en los tres puertos monitoreados. Balao registró la mayor abundancia, con un promedio de 51 unidades, seguido de Nuevo Porvenir con 44 y Puerto Envidia con 40 unidades.

La distribución de frecuencias de talla osciló entre 70 mm y 92 mm de ancho de cefalotórax (AC). En el seguimiento de la pesquería se contabilizó un total de 134 recolectores (esfuerzo pesquero), quienes en conjunto obtuvieron 6 111 cangrejos. La captura promedio fue de 13 cangrejos/hombre/hora/día en Balao, 11 en Nuevo Porvenir y 10 en Puerto Envidia. Del total de la captura, el 97% de los ejemplares se encontró dentro del rango de la talla mínima permitida (≥ 75 mm AC), mientras que solo el 3% estuvo por debajo de este valor, evidenciando una extracción mayoritariamente compuesta por individuos de talla legal.

Conclusión:

Para este mes se evidenció un incremento en las capturas de cangrejo rojo de manglar en los tres puertos evaluados (Balao, Nuevo Porvenir y Puerto Envidia), en comparación con el mes de agosto. Este aumento está relacionado con la finalización del periodo de muda, lo que permitió una mayor disponibilidad de individuos en los cangrejales. En contraste, en agosto las capturas fueron menores debido al inicio de dicho proceso, que reduce la actividad y vulnerabilidad del recurso a la captura.