

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO EN PUERTO GENERAL DE VILLAMIL “PLAYAS” Y ENGABAO– PROVINCIA DEL GUAYAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco capturado por la flota artesanal, obtenida mediante muestreos realizados en los puertos pesqueros de “General Villamil Playas y Engabao”, provincia del Guayas, seguimientos mensuales que realiza el IPIAP en el marco de investigación pesquera artesanal.

»» INFORMACIÓN GENERAL


| PERÍODO DE ANALISIS | DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO | ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO | FLOTA ACTIVA PROMEDIO |
|---------------------|---------------------------------|--|--|
| Febrero 2025 | Playas 83.7 t Engabao 27.0 t | <ul style="list-style-type: none">5 lances de pesca3 horas efectivas de pesca |  150 Embarcaciones |

Penaeus Stylirostris




ARTE DE PESCA

Trasmallo de fondo



ZONA DE MUESTREO




»» INDICADORES


| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 13.2% | Ejemplares juveniles dentro de las capturas | 16.3% | No se tomó información en el mes anterior |
| 86.8% | Ejemplares adultos dentro de las capturas | 42.4% | Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas |

»» TENDENCIAS


ESTRUCTURA DE TALLAS




VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES TOTALES (t)



VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS PESCA OBJETIVO



VALORES CRÍTICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 21 cm Lt
- Longitud óptima de captura: 16.5 cm Lt

»» PERSPECTIVAS

Después del periodo de veda (diciembre-enero), se pudo observar en Playas de Villamil un leve incremento en los desembarques de langostino 16.3%, la especie más predominante fue *Penaeus stylirostris* 51,0%. La talla media de captura fue de 15.8 cm LT. Referente a la madurez sexual, se pudo evidenciar que el 42.4% de las hembras de camarón se encontraron en estadio desarrollo-madura.

Elaborado por:
Bla. Evelyn Ramos Salazar
everamos@institutopesca.gob.ec