



SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO BALAO, PUERTO. BAQUERIZO Y PUERTO EL MORRO - PROVINCIA DEL GUAYAS

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo pesquero) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente a julio de 2026, en la provincia del Guayas. Los puertos visitados fueron Balao, Puerto Baquerizo y Puerto El Morro. La extracción de cangrejos se realizó en los esteros Bocana, Miramar, Playa Blanca, Marranche, Culebra, Colombiana, Lagarto, Limbo, Mosquiñaña y Manglecito. La información presentada a continuación corresponde a los muestreos realizados en estos puertos de la provincia del Guayas.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DE	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
Julio 2026		4311 unidades de cangrejo	3,6 horas efectivas	143

Cangrejo rojo (*Ucides occidentalis*)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO



INDICADORES

90% De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura


3 Puertos visitados: Balao, Pto. Baquerizo y Pto. El Morro

TENDENCIAS


DESEMBARQUES (Número de individuos)



CPUE (Captura hombre/día)



ESTRUCTURA DE TALLAS



Valores críticos:

Talla legal: 75mm AC

Talla máxima: 89 mm AC

PERSPECTIVAS

En julio, el 90 % de los individuos registrados cumplió con la talla mínima de captura permitida, establecida en 75 mm de amplitud del cefalotórax. En Balao, con un esfuerzo de 46 recolectores, se obtuvo un desembarque total de 1.032 cangrejos, correspondiente a una CPUE de 22 cangrejos por hombre por día. En Puerto Baquerizo, se registró un esfuerzo de 37 recolectores, quienes alcanzaron un desembarque total de 1.235 cangrejos, con una CPUE promedio de 33 cangrejos por hombre por día. En Puerto El Morro, 60 recolectores obtuvieron un desembarque total de 2.044 cangrejos, con una CPUE promedio de 34 cangrejos por hombre por día.

Cabe indicar que, de acuerdo con los diálogos sostenidos con los cangrejeros de los puertos visitados, las madrigueras ubicadas en las zonas altas ya se encuentran tapadas, mientras que, en las zonas bajas, se estima que durante la primera semana de agosto las madrigueras se tapen o cierren en su totalidad. Este comportamiento podría constituir un indicio del inicio del proceso de muda o ecdisis.