

PRESENCIA MASIVA DE LA JAIBA MORA (*EUPHYLAX DOVII*) EN EL ECUADOR CONTINENTAL

INFO-EE-2026-004



Presencia masiva de la jaiba mora (*Euphyllax dovii*) en el Ecuador continental

Boletín de Noticias

Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca

El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), informa a la ciudadanía y al sector pesquero sobre la reciente presencia masiva de la jaiba mora (*Euphyllax dovii*) frente a las costas de Manabí y Esmeraldas durante el primer trimestre de 2026. Esta especie es un crustáceo bentodemersal cuya presencia está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas.

Durante las últimas semanas, pescadores artesanales han reportado concentraciones significativas tanto en zonas oceánicas como costeras, evidenciando un proceso activo de dispersión hacia la plataforma continental ecuatoriana. Los análisis realizados indican que esta proliferación está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26 y 27 °C, alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables.



Figura 1. Jaiba mora (*Euphyllax dovii*)

Asimismo, se ha identificado una elevada proporción de individuos en estado reproductivo avanzado, lo que sugiere la persistencia temporal del fenómeno. Desde el punto de vista pesquero, la presencia de esta especie ha generado impactos operativos, incluyendo daños en redes, reducción de capturas objetivo e incremento de costos operativos.

El IPIAP mantiene un monitoreo permanente de esta situación y recomienda al sector pesquero mantenerse informado a través de los canales oficiales. Esta información permitirá implementar medidas oportunas y fortalecer la gestión sostenible de los recursos marinos.



Figura 2. Registro fotográfico de la jaiba mora en artes de pesca



Figura 3. Distribución espacial de la ocurrencia en la costa ecuatoriana