



DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL EN SANTA ROSA Y ANCONCITO (PROVINCIA DE SANTA ELENA) PECES DEMERSALES Y SU PESCA ACOMPAÑANTE

Se presenta información pesquera, desembarques, esfuerzo pesquero estimados en los puertos de Santa Rosa y Anconcito de la provincia de Santa Elena.

» INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANÁLISIS

Mayo 2026

DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO

Santa Rosa 159,4 T

Anconcito 66,2 T

ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO

1 lance de pesca/2500 anzuelos

1 a 4 horas efectivas de pesca

FLOTA ACTIVA PROMEDIO




Santa Rosa 40


Anconcito 15

ARTE DE PESCA UTILIZADAS


Línea de mano



Red de enmalle de fondo



Espinel de fondo




Especie predominante en los desembarques

Rabijunco (*Hemanthias signifer*)



Áreas de pesca: A 5 hasta 10 millas afuera de las costas de la península de Santa Elena




>>> INDICADORES

100%	Las capturas estuvieron dirigidas a peces demersales como: Rabijuncos, perelas, corvinas, pámpanos, robalos, lisas, anguilas, pargos entre otros.
63	Especies registradas, de las cuales 60 correspondieron a peces demersales óseos, 2 a peces cartilaginosos y 1 especie pelágica.
3	Artes de pesca distintas utilizadas por pescadores artesanales (Línea de mano de fondo, enmalle de fondo y espinel de fondo).
80	Pescadores artesanales entrevistados, 65 en Santa Rosa y 39 en Anconcito.
24	Días de pesca/promedio al mes reportaron los pescadores artesanales


>>> TENDENCIAS

Tendencia mensual del desembarque (t) de peces demersales en Santa Rosa y Anconcito.






DESEMBARQUES (T) ESTIMADOS DE PECES DEMERSALES



Estructura de tallas

Estructura de tallas de Rabijunco (*Hemanthias signifer*)

Mayo 2026





»» NOVEDADES DE LA PESCA

Las capturas se redujeron un 39% en comparación con el mes anterior, con un desembarque total estimado de peces demersales de 225,6 t, esta disminución podría deberse a varios factores que ocurrieron en la semana de monitoreo como la falta de carnada, presencia de jaiba mora en la pesca con red de enmalle de fondo, inseguridad y el calentamiento del mar ecuatoriano. Las especies con mayor representatividad fueron *Hemanthias signifer* (rabijunco), con 20,1%; *Paralabrax humeralis* (perela) con 20 % y *P. callaensis* (Perela/cagalo) con 18,7%.

Elaborado por:

E. Laaz (elaaz@institutopesca.gob.ec)

M. Preciado (mpreciado@institutopesca.gob.ec)