

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN LANGOSTINO EN  
PUERTO BOLIVAR Y BAJO ALTO – PROVINCIA DE EL ORO

TENDENCIAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco capturado por la flota artesanal, obtenida mediante muestreos en la provincia de El Oro, llevada a cabo en los puertos de Puerto Bolívar y Bajo Alto los cuales fueron establecidos a través del seguimiento realizado por el IPIAP.


INFORMACIÓN GENERAL

| PERIODO DE ANALISIS | DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO              | ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO                                                                              | FLOTA ACTIVA PROMEDIO                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Julio 2026          | Pto Bolívar 30.52 t<br>Bajo Alto 6.44 t | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 lances de pesca</li> <li>2 horas efectivas de pesca</li> </ul> | <div>                      Pto. Bolívar 120<br/>                     Bajo Alto 35                 </div> |


Penaeus occidentalis



ARTE DE PESCA  
Trasmallo de fondo




ZONA DE MUESTREO




INDICADORES

|        |                                             |        |                                                      |
|--------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 57.18% | Ejemplares juveniles dentro de las capturas | 00%    | Sin datos, en relación al mes anterior               |
| 42.82% | Ejemplares adultos dentro de las capturas   | 78.94% | Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas |


ESTRUCTURA DE TALLAS



DESEMBARQUES TOTALES (t)



TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



VALORES CRITICOS


- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 20.1 cm Lt
- Longitud optima de captura: 14.2 cm Lt

PERSPECTIVAS

Del muestreo de julio, realizado en Bajo Alto y Pto. Bolívar el *P. occidentalis* dominó con un 50%, la talla promedio de captura fue de 14,2 cm/Lt con una longitud máxima de 20.1 cm/Lt. Se destaca un continuo desarrollo, de estos crustáceos puesto que, se evidenció un 57.18 % de ejemplares juveniles, es decir por debajo de la talla de madurez sexual (14.5 cm/Lt) la que, aún no han alcanzado su madurez sexual.

Se espera que, debido al continuo aumento de temperatura a nivel costero, la cantidad de desembarque total se mantenga o en su defecto aumente en los próximos meses.

COMPOSICION % DE LAS ESPECIES CAPTURADAS



Elaborado por:  
Jorge Correa Cárdenas  
[jcorrea@institutopesca.gob.ec](mailto:jcorrea@institutopesca.gob.ec)