

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN LANGOSTINO EN
PUERTO BOLIVAR Y BAJO ALTO – PROVINCIA DE EL ORO

>>> TENDENCIAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco capturado por la flota artesanal, obtenida mediante muestreos en la provincia de El Oro, llevada a cabo en los puertos de Puerto Bolivar y Bajo Alto los cuales fueron establecidos a través del seguimiento realizado por el IPIAP.


>>> INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Marzo 2026	Puerto Bolívar - Bajo Alto 1.98 t	1 lances de pesca 2 horas efectivas de pesca	 Puerto Bolívar - Bajo Alto 30


Penaeus stylirostri



ARTE DE PESCA
Trasmallo de fondo




ZONA DE MUESTREO




>>> INDICADORES

95%	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	%	El mes anterior no hubo desembarques (veda)
5%	Ejemplares adultos dentro de las capturas	93%	Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas


ESTRUCTURA DE TALLAS




VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES
 TOTALES (t)



VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE
 CAPTURA



COMPOSICION DE LAS CAPTURAS PESCA
 OBJETIVO



VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 21 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.5 cm Lt

PERSPECTIVAS

Del muestreo realizado en Bajo Alto, el *P. stylirostris* dominó con un 59% frente a *P. occidentalis* y *P. vannamei*. La longitud total promedio es de 12,85 cm y una longitud máxima de 16 cm Lt. Es importante resaltar que, para este mes la captura cuenta con un 95% de ejemplares juveniles, por debajo de la talla de madurez sexual (14.5 cm) lo que sugiere una presión pesquera en tallas que aún no han alcanzado su madurez sexual. Debido a la Jaiba Mora muchas embarcaciones han paralizado o han cambiado de zona y se están dirigiendo hacia la captura de pescado.

Elaborado por:
 Walter A. Méndez Cucalón
wmendivez@institutopesca.gob.ec