

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO EN PLAYAS DE VILLAMIL Y ENGABAO – PROVINCIA DE GUAYAS

Se muestra información pesquera y biológica del camarón marino capturado por la flota artesanal, obtenida mediante entrevistas y muestreos realizadas en los puertos pesqueros de Playas de Villamil y Engabao, provincia de Guayas, seguimientos mensuales que realiza el IPIAP en el marco de investigación pesquera artesanal.


INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Mayo 2026	Playas 109.19 t Engabao 32.34 t	4 lances de pesca 1:50 horas efectivas de pesca	 Playas 220 Engabao 150


ESPECIE PREDOMINANTE
Penaeus occidentalis



ARTE DE PESCA
Trasmallo de fondo



ZONA DE MUESTREO




INDICADORES

35.4 %	Ejemplares juveniles dentro de las capturas para San Jacinto	109 %	Aumento en los desembarques en relación al mes pasado (Abril)
64.5 %	Ejemplares adultos dentro de las capturas	87.3 %	Hembras adultas desovadas dentro de las capturas (estadio vacío)




TENDENCIAS

ESTRUCTURA DE TALLAS




VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES TOTALES (t)




VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 22 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.5 cm Lt

VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA DE PESCA OBJETIVO



PRINCIPALES HALLAZGOS Y PERSPECTIVAS

En relación con Abril, existió un aumento en los desembarques de 2.09 veces mayor para Playas y Engabao. La especie capturada predominante fue *Penaeus occidentalis* con el 47 % dentro de las capturas totales, la talla media de captura para las 3 especies fue 15.3 cm LC. La flota artesanal de Playas y Engabao indica encontrar Jaiba Mora (*Euphyllax dovii*) en sus operaciones de pesca cercanas a la costa entre 3 y 6 MN. Se espera que debido a las condiciones ambientales, principalmente el aumento de temperatura en la franja litoral, la cantidad de desembarque total continúe aumentando para ambas caletas pesqueras.

Elaborado por:
Kevin Tapia-Rodríguez
Investigador Pesquero
ktapia@institutopesca.gob.ec