



SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO BALAO, PUERTO. BAQUERIZO Y PUERTO EL MORRO - PROVINCIA DEL GUAYAS

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo pesquero) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente a julio de 2026, en la provincia del Guayas. Los puertos visitados fueron Balao, Puerto Baquerizo y Puerto El Morro. La extracción de cangrejos se realizó en los esteros Bocana, Miramar, Playa Blanca, Marranche, Culebra, Colombiana, Lagarto, Limbo, Mosquifañña y Manglecito. La información presentada a continuación corresponde a los muestreos realizados en estos puertos de la provincia del Guayas.

»» INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DE	CAPTURA TOTAL ESTIMADA	ESFUERZO PROMEDIO DE PESCA	CANGREJEROS ACTIVOS
Julio 2026		4311 unidades de cangrejo	3,6 horas efectivas	143

Cangrejo rojo (*Ucides occidentalis*)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO



»» INDICADORES


90% De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura

3 Puertos visitados: Balao, Pto. Baquerizo y Pto. El Morro




TENDENCIAS


CAPTURA (Número de individuos)



CPUE (Captura hombre/hora)



ESTRUCTURA DE TALLAS



Valores críticos:

- Talla legal: 75mm AC
- Talla máxima: 89 mm AC

PERSPECTIVAS

En julio, el 90 % de los individuos registrados cumplió con la talla mínima de captura permitida (75 mm de amplitud del cefalotórax). En Balao, se capturaron 1.032 cangrejos con la participación de 46 recolectores, alcanzando una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de 7 cangrejos por hombre por hora. En Puerto Baquerizo, 37 recolectores obtuvieron 1.235 ejemplares, con una CPUE de 8 cangrejos por hombre por hora. Por su parte, Puerto El Morro registró la mayor captura, con 2.044 cangrejos recolectados por 60 personas y una CPUE de 9 cangrejos por hombre por hora.

Cabe indicar que, de acuerdo con los diálogos sostenidos con los cangrejeros de los puertos visitados, las madrigueras ubicadas en las zonas altas ya se encuentran tapadas, mientras que, en las zonas bajas, se estima que durante la primera semana de agosto las madrigueras se tapen o cierren en su totalidad. Este comportamiento podría constituir un indicio del inicio del proceso de muda o ecdisis.



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**XAVIER NAPOLEON
ICAZA TORRES**

Elaborado por xicaza@institutopesca.gob.ec