

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO
 PUERTO BOLIVAR, PUERTO JELI Y HUALTACO - PROVINCIA DE EL
 ORO

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo pesquero) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente a agosto de 2026, en los puertos de Puerto Bolívar, Puerto Jeli y Hualtaco, provincia de El Oro. La extracción de cangrejos se realizó en los esteros Payana, Cabos, San Gregorio, Jumón, Cargadero, Pobreza y Huacas. La información presentada a continuación corresponde a los muestreos realizados en los puertos antes mencionados.

>>> INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
Agosto 2026	2580 unidades de cangrejo	4 horas efectivas	 94

Cangrejo rojo (*Ucides occidentalis*)




ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



ZONA DE MUESTREO



>>> INDICADORES


78% De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura

3 Puertos visitados: Pto. Bolívar, Pto. Jeli, y Hualtaco




TENDENCIAS


DESEMBARQUES (Número de individuos)



CPUE (Captura hombre/día)



ESTRUCTURA DE TALLAS



Valores críticos:

- Talla legal: 75mm AC
- Talla máxima: 90 mm AC

PERSPECTIVAS

En agosto, el 78 % de los individuos registrados cumplió con la talla mínima de captura permitida, establecida en 75 mm de amplitud del cefalotórax. En Puerto Jeli, con un esfuerzo de 45 recolectores, se obtuvo un desembarque total de 1.332 cangrejos, correspondiente a una CPUE de 30 cangrejos por hombre por día. En Hualtaco, se registró un esfuerzo de 49 recolectores, quienes alcanzaron un desembarque total de 1.248 cangrejos, con una CPUE promedio de 25 cangrejos por hombre por día, evidenciando una menor eficiencia de captura individual en comparación con Puerto Jeli. Por su parte, la medición de tallas comerciales se realizó en Puerto Bolívar y Puerto Jeli.

Cabe indicar que, de acuerdo con los diálogos sostenidos con los cangrejeros de los puertos visitados, las madrigueras ubicadas tanto en las zonas altas como en las bajas se encuentran tapadas, lo que podría constituir un indicio del inicio del proceso de muda o ecdisis. Asimismo, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control por parte de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), debido a que la estructura de tallas registrada evidencia que el 22 % de los individuos se encuentra por debajo de la talla mínima de captura establecida.