REPORTE WEB JULIO 2026

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA
ECUADOR

DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL EN SANTA ROSA Y ANCONCITO (PROVINCIA DE SANTA ELENA)

PECES DEMERSALES Y SU PESCA ACOMPAÑANTE

Se presenta información pesquera, desembarques, esfuerzo pesquero estimados en los puertos de Santa Rosa y Anconcito de la provincia de Santa Elena.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANÁLISIS
Julio 2026


DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO
Santa Rosa 152,2 T
Anconcito 115,1 T

ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO
1 lance de pesca/2500 anzuelos
1 a 4 horas efectivas de pesca


FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Santa Rosa 20
Anconcito 30

ARTE DE PESCA UTILIZADAS


Línea de mano



Red de enmalle de fondo



Espinel de fondo




Especie predominante en los desembarques

Perela (*Paralabrax humeralis*)



Áreas de pesca: A 5 hasta 10 millas afuera de las costas de la península de Santa Elena




INDICADORES


100%	Las capturas estuvieron dirigidas a peces demersales como: Rabijuncos, perelas, corvinas, pámpanos, robalos, lisas, anguilas, pargos entre otros.
74	Especies registradas, de las cuales 68 correspondieron a peces demersales óseos, 3 a peces cartilaginosos y 3 especies pelágicas.
3	Artes de pesca distintas utilizadas por pescadores artesanales (Línea de mano de fondo, enmalle de fondo y espinel de fondo).
82	Pescadores artesanales entrevistados, 46 en Santa Rosa y 36 en Anconcito.
27	Días de pesca/promedio al mes reportaron los pescadores artesanales

TENDENCIAS


Tendencia mensual del desembarque (t) de peces demersales en Santa Rosa y Anconcito.



DESEMBARQUES (T) ESTIMADOS DE PECES DEMERSALES



Estructura de tallas de rabijunco *Hemanthias signifer*



NOVEDADES DE LA PESCA

Las capturas aumentaron un 18,5% en comparación con el mes anterior, con un desembarque total estimado de peces demersales de 267,3 t, este aumento podría deberse a varios factores que ocurrieron en la semana de monitoreo como la no presencia de jaiba mora en la pesca con red de enmalle de fondo y el aumento del precio del pescado. Las especies con mayor representatividad fueron *Paralabrax humeralis* (perela) con 15,5 %, *P. callaensis* (Perela/cagalo) con 15% y *Hemanthias signifer 12%.*

Elaborado por:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ENRIQUE DANIEL LAAZ MONCAYO

E. Laaz (elaaz@institutopesca.gob.ec)