


Abundancia del ictioplancton durante octubre 2026



Castañeta (Azurina atrilobata)




Mojarra (Eucinostomus gracilis)

Abundancia del ictioplancton durante octubre 2026


PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Abundancia de huevos y larvas por localidad — octubre 2026





Puerto López registró la mayor abundancia de huevos de peces a nivel superficial, mientras que las larvas registraron valores similares en los dos niveles muestreados. Caso contrario se evidencio en Salinas, donde el número de larvas fue superior a los huevos en los dos tipos de arrastres realizados.

Composición de especies del ictioplancton según hábitat en Puerto López



La composición de los huevos de peces estuvo ampliamente dominada por la especie pelágica pequeña chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*), seguida por la guabina (*Synodus spp.*) especie asociada a arrecifes. En cuanto a las larvas, se observó una mayor diversidad de taxones y hábitats. La especie con mayor abundancia fue la mojarra (*Eucinostomus gracilis*) especie demersal, seguida de plumón y guabina (*Bregmaceros bathymaster* y *Synodus spp.*) especies pelágicas y asociadas a arrecifes.

Composición de especies del ictioplancton según hábitat en Salinas



En lo que respecta a la fase de huevos la especie dominante fue guabina (*Synodus spp.*) asociada a arrecife, seguido de especies de hábitat pelágico pequeño y demersales, siendo las más abundantes sardina redonda y pez plano (*Etrumeus acuminatus* y *Citharichthys spp.*). En cuanto a las larvas, se registró altas concentraciones de especie de hábitat demersal como la mojarra (*Eucinostomus gracilis*), seguido de la especie asociada arrecife castañetas (*Azurina atrilobata*).

¿QUÉ NOS DICEN NUESTROS RESULTADOS?

En Puerto López, la dominancia de huevos correspondió a chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*), evidenciando continuidad en la actividad reproductiva de esta especie de interés pesquero. Mientras que en Salinas, la guabina (*Synodus spp.*) asociada arrecife fue la más abundante. Por su parte, en el estadio larval, tanto Pto. López como Salinas estuvieron dominados por mojarra (*Eucinostomus gracilis*) recurso de hábitat demersal de interés comercial.

HALLAZGO RELEVANTE

Los resultados evidencian una importante actividad reproductiva del chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*) especie pelágico pequeño de interés pesquero , en Puerto López. Mientras que, el estadio larval mostró un patrón común y consistente en ambas estaciones, dominado ampliamente por la mojarra (*Eucinostomus gracilis*).

