

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DEL CAMARÓN MARINO EN
RACAFUERTE-TONCHIGUE-PROVINCIA DE ESMERALDAS

Se muestra información biológica-pesquera del camarón blanco y/o langostinos, capturado por la flota artesanal la misma que, fue obtenida mediante entrevistas/encuestas directas a los pescadores artesanales. La data biológica se obtuvo, producto de los muestreos biométricos en los centros de acopio y/o comercializadoras en Tonchigue provincia de Esmeraldas, caleta pesquera que mensualmente son monitoreadas por técnicos del IPIAP.

INFORMACIÓN GENERAL


PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Febrero 2026	Rocafuerte 6.94 t Tonchigue 0.24 t	2 lances de pesca 1 horas efectivas de pesca	 Rocafuerte 15 Tonchigue 15

Penaeus vannamei




ARTE DE PESCA

Trasmallo de fondo



ZONA DE MUESTREO




INDICADORES


0.001 %	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	0.00 %	Sin información debido a veda de langostino.
99.99 %	Ejemplares adultos dentro de las capturas	51.80 %	Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas

>>>TENDENCIAS


ESTRUCTURA DE TALLAS



VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES
 TOTALES (t)




VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 19.5 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.1 cm Lt

COMPOSICION DE LAS CAPTURAS PESCA
 OBJETIVO



>>>PERSPECTIVAS

Según pescadores artesanales las capturas de camarón se mantuvieron bajas 0.24 t., debido a la presencia masiva de jaiba mora *Euphyllax dovii*, la cual, además de dañar en un 90 % los artes de pesca –trasmallos- hizo qué, disminuyera el esfuerzo así como escasee la pesca asociada o acompañante. La especie de camarón más predominante fue el *Penaeus occidentalis* con el 58.0 %, la talla media de captura para todos los penaeidos fue de 16.1 LT/cm.

Referente a la pomada negra *Xiphopeneus riveti*, esta es capturada en Roca fuerte por una flota activa de 12 - 15 canoas –changas- para una captura mes de 6.94 t. Se infiere para marzo que, mientras esté presente la jaiba mora, la situación se mantenga a la baja –menos recurso, escasa operatividad de la flota langostera-. No obstante, para el caso de la pomada en Roca fuerte, se prevé que, la situación no varíe.