

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO EN TONCHIGUE Y CAMARÓN POMADA EN ROCAFUERTE - PROVINCIA DE ESMERALDAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco (langostino) y camarón pomada, capturados por la flota artesanal. La información obtenida fue mediante muestreos y encuestas realizados en la provincia de Esmeraldas, los que fueron llevados a cabo en los puertos de Tonchigue y Rocafuerte, producto del seguimiento realizado por el IPIAP en mayo 2026.

>>> INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Mayo 2026	Rocafuerte 8.5 t Tonchigue 0.5 t	3 lances de pesca 2 horas efectivas de pesca	 Rocafuerte 12 Tonchigue 10 Embarcaciones


Penaeus occidentalis




Protrachypene precipua




ARTE DE PESCA
Trasmallo de fondo (langostino)



ZONA DE MUESTREO



Changa (camarón pomada)




>>> INDICADORES Langostino


0%	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	18.0%	Decremento de los desembarques en relación al mes anterior
100%	Ejemplares adultos dentro de las capturas	38.0%	Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas

>>> TENDENCIAS


ESTRUCTURA DE TALLAS



VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES
 TOTALES (t)





VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE
 CAPTURA



INDICADORES Pomada

28.0%	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	3.4%	Incremento de los desembarques en relación al mes anterior
72.0%	Ejemplares adultos dentro de las capturas	54.0%	Ejemplares vacías sexualmente dentro de las capturas

COMPOSICION DE LAS CAPTURAS PESCA OBJETIVO



VALORES CRITICOS (langostino)

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 21 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.5 cm

VALORES CRITICOS (pomada)

- Talla de madurez sexual: 6,6 cm Lt
- Longitud máxima: 9,1 cm Lt
- Longitud optima de captura: 6.9 cm

PERSPECTIVAS

Con relación a langostino las capturas disminuyeron con relación al mes anterior, la especie más representativa dentro de las capturas fue *Penaeus occidentalis*; la talla media de captura fue 16.5 cm Lt, la zona de monitoreo corresponde a Tonchigue. Con respecto al camarón pomada, este es capturado con red de changa en la zona de Rocafuerte donde existe una pequeña flota que pesca con este tipo de arte, las capturas tuvieron un ligero incremento si lo comparamos con el mes de abril, la talla media de captura fue 6.6 cm Lt. El aumento o disminución en las capturas de un recurso muchas veces depende de las condiciones ambientales y durante este mes también influyó la presencia masiva de la jaiba mora *Euphyllax dovii*, debido a esto, muchos pescadores optaron por no salir a faenas de pesca. De no mejorar las condiciones climáticas en los próximos meses, se podría ver afectado de manera negativa el rendimiento de pesca.

Elaborado por:
Blga. Evelyn Ramos Salazar
eramos@institutopesca.gob.ec